

Doküman Kodu	FRB.HD.RB.02
Yayın Tarihi	06.09.2016
Revizyon Numarası	00
Revizyon Tarihi	---
Sayfa Numarası	1/2

Sayın Hasta, Sayın Veli / Vasi

A- Genital siğilin (Kondilomun) cerrahi tedavisi genel, spinal veya lokal anestezi altında yapılabilir. Saha temizliği sonrası kondilom (Genital Siğiller) boyutuna ve hastalığınızın durumuna göre cerrahi olarak çıkarılabilir, koter veya karbondioksit lazer uygulanması ile yakılabilir. Siğil eksizyonunda siğil tabanından bistüri ile kesilerek çıkarılır. Koter ile kanama kontrolü sonrası sütür ile kesi yeri dikilir. Siğiller koter ile veya karbondioksit lazer ile direk yakılabilir.

B- ANESTEZİ

Anestezi ve içerdiği riskler hakkında bilgi edinmek için "Anestezi Hakkında" bilgilendirme sayfalarına bakınız. Eğer herhangi bir endişeniz varsa konu hakkında anestezistiniz ile konuşabilirsiniz. Bilgilendirme sayfası size verilmemişse lütfen bir tane isteyiniz.

C- BU AMELİYATIN RİSKLERİ

Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler / komplikasyonlar vardır.

Ameliyattaki Riskler

- 1- Tedavi yerinde ağrı sık görülür. Ağrı kesici tedavisi ile genellikle geçer.
- 2- Ameliyat bölgesinde kanama nadiren görülür.
- 3- %70' e varan oranda kondilom ortadan kaldırılabilir.
- 4- %20 düzeldikten sonra tekrarlayabilir.
- 5- Ameliyat bölgesinde sıklıkla skar (Yara İzi) gelişir.
- 6- Tedaviye yetersiz yanıt olabilir.
- 7- Tedavi sırasında fark edilmeyen milimetrik lezyonlar işlem sonrası büyüyebilir.
- 8- Tedavi, hastalığa neden olan virüsü (HPV) ortadan kaldırmayabilir.
- 9- Hastalığa neden olan virüsün bazı alt tipleri kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Tedavi eşe bulaşmayı engellemeyebilir.
- 10- Hastalığa neden olan virüsün bazı alt tipleri penis ve anal bölge tümörüne neden olabilir.

Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler:

Human Papilloma Virüs (HPV) insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğile (Kondilom) neden olan bir virüstür. Bazı alt tipleri kadınlarda rahim ağzında kansere, erkeklerde penis derisi kanserine ve her iki cinsiyette anal ve orofarangeal kansere neden olabilir. Kanserler yavaş, yıllar içinde gelişir. Siğillerin ortaya çıkması kişinin bağışıklığı ile ilişkilidir. Erkeklerde siğil ortaya çıkmasa bile bulaştırabilir. Tedavisinde boyutuna göre ilaç tedavisi, dondurma, yakma veya cerrahi eksizyon yapılabilir. Tedavi sonrası sıklıkla tekrarlayabilir. Başarılı tedavi sonrasında bile bulaşıcılık devam edilebilir.

Girişimin Yapılmaması Durumunda Neler Olabilir?

Bir kısım siğil gerilemekle birlikte siğiller daha da büyüyebilir. Yaygın siğil olması bulaşıcılığı artırabilir ve kötü bir görünüme neden olabilir.

Nasıl Bir Tedavi / Girişim Uygulanacak?

Ameliyat yöntemine yukarıda değinilmiştir. Alternatif olarak takip edilebilir, takipte özellikle küçük lezyonlar geçebilir. Lezyon üzerine sürülen ilaç tedavisi (İmiquimod, Podophyllin ve Podofilox, Trichloroasetik Asit) verilebilir. Başarı oranı %30 - %80 arasındadır. Eritem, irritasyon, ülserasyon, yanma, ağrıya neden olabilir. Dondurma (Kryoterapi) yapılabilir. Başarı oranı %60 - %90' dır. Uygulama alanında ağrı ve su toplamasına neden olabilir. Tekrarlama oranı %20 - %40' dır.

Hastanın Girişimin Şekli, Zamanı, Yan Etkileri, Başarı Oranı ve Başarıdan Ne Kastedildiği, Girişim Sonrası İle İlgili Soruları:

- Ameliyatta beklenen başarı, bütün siğillerin alınması veya yakılmasıdır.
- Ameliyatın başarı oranı hastalığın boyutuyla ilgili olmakla birlikte %35 - %70' dir
- Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler / komplikasyonlar mevcut olup, bunlar yukarıda belirtilmiştir.
- Girişim sonrası her şeyin yolunda gitmesi durumunda hasta, aynı gün taburcu edilir.

**GENİTAL SİĞİL (KONDİLOM) CERRAHİ
TEDAVİSİ ONAM FORMU**

Doküman Kodu	FRB.HD.RB.02
Yayın Tarihi	06.09.2016
Revizyon Numarası	00
Revizyon Tarihi	---
Sayfa Numarası	2/2

Girişimden Önce Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Genel ya da spinal anestezi planlanıyorsa, ameliyat olacağınız gecedan itibaren hiçbir şey yememelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz.

4Girişimden Sonra Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (At, Eşek vs.) binmemelisiniz. İlk 3 hafta cinsel ilişkide bulunmamalısınız. Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalıdır.

Hekimin Hasta Hakkında Bilmek İstedikleri

Kullandığı İlaçlar :
Kanama Zamanı :
Alerji :
Diğer Hastalıklar :

Hekimin Bilgilendirme Konuşmasına Ait Notları:**Hekimin Kaşesi ve İmzası****Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması**

- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
- Planlanan tedavi / girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
- Tedavi / Girişim' den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Tanı / Tedavi / Girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabileceği açıklandı.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- Tedavi / Girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
- İstemediğim takdirde Tedavi / Girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve / veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.

Not : Lütfen el yazınızla aşağıdaki kutucuğa "2 sayfadan oluşan bu onamı okudum, anladım ve kabul ediyorum" yazınız ve imzalayınız.

**Hastanın / Veli / Vasi Veya Yakınının
Adı, Soyadı ve İmzası:**

Şahidin Adı, Soyadı ve İmzası (Yakınlık Derecesi)

Tarih ve Saat :